



Показания:

- ✦ усиленное газообразование и накопление газов
- ✦ диспепсия
- ✦ в качестве пеногасителя при острых отравлениях моющими средствами

Способ применения и дозы: применяется после еды и перед сном:

дети от 28 дня жизни до 2 лет по 8 капель 4 раза в сутки,
дети от 2 до 6 лет по 14 капель 4 раза в сутки,
дети старше 6 лет и взрослые по 16 капель 4 раза в сутки

Противопоказания:

повышенная чувствительность к симетикону и /или другим компонентам препарата, кишечная непроходимость, обструктивные заболевания ЖКТ

Условия отпуска из аптек: Без рецепта

Производитель: Медана Фарма АО 98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, Польша

Перед применением и назначением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Регистрационное удостоверение: РК/ЛС-5-№015656 от 15.02.2010 Разрешение №3306 от 17.02.2012 г.

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)
Представительство ФЗ "Польфарма" СА в РК,
г. Алматы, пр. Аль-Фараби 15, бизнес-центр «Нурлы Тау» 4В, офис 1201, тел./факс: +7 (727) 3111-289



Человек и Лекарство – Казахстан

Научно-практический
тематический журнал

6(10), 2012

Дети должны быть
здоровы, дети должны
быть счастливы!

Целиакия как актуальная
проблема детской
гастроэнтерологии

Рекомендации
Американской Академии
Педиатрии (AAP)

Атопический
дерматит у детей

О кишечной колике
грудных детей

Аллергические «маски»
соматических болезней
у детей



№6 (10), 2012

Педиатрия

Человек и Лекарство – Казахстан

АНТРАЛЬ

Здоровье печени в твоих руках!



- ✓ Восстанавливает клетки и функции печени
- ✓ Обладает противовоспалительным и обезболивающим действием
- ✓ Нормализует обмен веществ
- ✓ Защищает печень от воздействия токсинов
- ✓ Курс лечения 3-4 недели!

Показания к применению. Острые и хронические гепатиты различной этиологии (вирусные, алкогольные, медикаментозные, токсические). Жировая дистрофия и циррозы печени. Воспалительные заболевания желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы. При резекции желчного пузыря. Профилактика заболеваний печени вследствие вредного воздействия токсинов различной этиологии: алиментарные токсины, лекарственные средства, химиотерапия, лучевая терапия.

Способ применения и дозы. Принимать внутрь через 20-30 минут после еды по 1 таблетке 3 раза в день на протяжении 3-4 недель.

Побочные действия. Редко возможны диспепсические явления.

Противопоказания. Нарушение выделительной функции почек. Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период лактации. Детский возраст до 4 лет. **Перед применением внимательно изучите инструкцию.**

Отпускается без рецепта врача.

Производитель: ОАО "Фармак", г. Киев, ул. Фрунзе, 63.
Представительство в РК: г. Алматы, пр. Абая 157, оф. 5, тел. +7 (727) 266 28 31

РК-ПС-5-№015726 от 17.03.2010 г.

Разрешение на рекламу № 3037 от 23.05.2011 г.

Спрашивайте в аптеках Вашего города.

Инструкция по применению лекарственного средства для специалистов

Лоризан®

Торговое название

Лоризан®

Международное непатентованное название

Лоратадин

Лекарственная форма

Таблетки 0,01 г, Гель назальный 0,5 %, Сироп

Фармакотерапевтическая группа

Прочие антигистаминные препараты для системного применения

Код АТС R06A X13

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Гель через 30 минут устраняет симптомы аллергии и действует в течение 24 часов. При местном применении препарат практически не оказывает системного действия.

Лоратадин быстро и хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и подлечит экстенсивному метаболизму первого прохождения, в основном ферментами CYP3A4 и CYP2D6. Основной метаболит – дезлоратадин (ДЛ) – является фармакологически активным и отвечает за большую часть клинического действия. Лоратадин и ДЛ достигают максимальной концентрации в плазме крови через 1-1,5 часа и 1,5-3,7 часа после приема, соответственно. Одновременный прием пищи может задерживать всасывание лоратадина, но не влияет на клиническое действие.

Лоратадин проникает через плаценту и выводится с грудным молоком.

Лоратадин связывается с белками плазмы от 97% до 99%, а его активный метаболит – от 73% до 76%. Средний период полувыведения составляет 8,4 часа (спектр от 3 до 20 часов) для лоратадина и 28 часов (спектр от 8,8 до 92 часов) для основного активного метаболита.

Приблизительно 27% дозы выводится с мочой в течение первых 24 часов. Около 40% дозы выводится с мочой и 42% с калом в течение 10-дневного периода в основном в виде сопряженных метаболитов.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью, значение площади под фармакокинетической кривой AUC и пик плазменного уровня (C_{max}) увеличиваются для лоратадина и его активного метаболита, но средний период полувыведения их не изменяется.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью гемодиализ не оказывает влияния на фармакокинетику лоратадина или его активного метаболита. У пациентов с хроническим алкогольным поражением печени, значения AUC и пик плазменного уровня (C_{max}) лоратадина удваиваются, при этом фармакокинетический профиль активного метаболита не изменяется. При этом период полувыведения лоратадина и его метаболита составляет 24 часа и 37 часов, соответственно, и повышается с увеличением тяжести течения заболевания печени.

Лоратадин и его активный метаболит выделяются с грудным молоком.

Фармакодинамика

Лоризан – противоаллергический препарат длительного действия, избирательно блокирующий периферические гистаминовые H1-рецепторы. Лоризан обладает противоаллергическим, антиэкссудативным, противозудным действием. Уменьшает проницаемость капилляров, снимает спазм гладкой мускулатуры, предотвращает развитие отека тканей. Не вызывает привыкания. В отличие от многих других антигистаминных средств Лоризан при использовании в рекомендуемой дозе не оказывает значимого действия на H2-рецепторы, не обладает клинически значимыми седативными и/или антихолинергическими свойствами.

Показания к применению

- аллергический ринит (сезонный и круглогодичный)
- аллергический конъюнктивит
- острая крапивница
- отек Квинке
- аллергические реакции на укусы насекомых
- зудящие дерматозы (контактный аллергодерматит, хроническая экзема).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь до еды.

Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают по 1/2 таблетки (5 мг) или 5 мл сиропа 1 раз в сутки (при массе тела ребенка более 30 кг назначают 1 таблетку (10 мг) или 10 мл сиропа 1 раз в сутки).

Детям старше 12 лет и взрослым назначают по 1 таблетке (10 мг) или 10 мл сиропа 1 раз в сутки.

Курс лечения – 10 – 15 дней. В некоторых случаях курс лечения устанавливают индивидуально – от 1 до 28 дней.

Назальный гель для местного применения.

Взрослым и детям (старше 2 лет) Лоризан наносят на слизистую оболочку носа 2 раза в день (при необходимости 3-4 раза в день).

Лечение проводят до достижения терапевтического эффекта – в среднем от 2 до 5 дней

Побочные действия

Для таблеток и сиропа

- головная боль, нервозность, усталость, сонливость
 - тошнота, сухость во рту, рвота, повышение аппетита
 - очень редко сыпь, алопеция, аллергические реакции
 - потливость, артралгии, миалгии, гиперкинезы
 - аритмии
- Для назального геля

Возможны

- увеличение количества выделений из носа
- появление ощущения зуда

Противопоказания

- гиперчувствительность к лоратадину и компонентам препарата
- беременность и период лактации
- дети до 2-х лет.

Лекарственные взаимодействия

Циметидин, эритромицин и кетоконазол увеличивают концентрацию препарата в сыворотке крови. В связи с возможностью развития дозозависимого седативного эффекта следует соблюдать осторожность при одновременном назначении с прочими блокаторами H1-рецепторов, барбитуратами, бензодиазепинами, агонистами опиоидных рецепторов, нейролептиками, трициклическими антидепрессантами, этанолом, анксиолитиками, седативными и снотворными средствами.

Особые указания

Препарат в терапевтических дозах не влияет на частоту сердечных сокращений, показатели артериального давления.

При алкогольном поражении печени максимальная концентрация в крови и период полувыведения повышаются с увеличением тяжести заболевания.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами. Лоризан не оказывает влияния на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами. Однако необходимо учитывать, что очень редко препарат может оказать седативное действие, которое может повлиять на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Симптомы: головная боль, сонливость, тахикардия.

Лечение: Проводят промывание желудка. Лечение симптоматическое.

Лоратадин нельзя вывести гемодиализом и не известно, выводится ли он перитонеальным диализом.

При местном способе применения опасность передозировки минимальна.

Форма выпуска и упаковка

Таблетки

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, 1 контурная ячейковая упаковка вместе с инструкцией по применению в пачке.

Назальный гель

По 15 г в тубы алюминиевые. По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Сироп

По 100 мл в банки или флаконы закрытые колпачками алюминиевыми или крышками. Каждую банку или флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках и дозатором вкладывают в пачку из картона.

Условия хранения

Таблетки

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от +15 °С до +25 °С.

Сироп

Хранить в защищенном от света месте, при температуре от 2 °С до 30 °С.

Назальный гель

В оригинальной упаковке при температуре от 10 °С до 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

3 года

После окончания срока годности препарат применяться не должен

Условия отпуска из аптек

Таблетки и сироп

По рецепту

Назальный гель

Без рецепта

Производитель

Таблетки и назальный гель

ОАО «Киевмедпрепарат».

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139;

тел./факс: (044) 216-31-84; 216-14-74.

Сироп

Корпорация «Артериум», АО «Галичфарм»,

Украина, 79024,

г. Львов, ул. Опришковская, 6/8

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:

Представительство корпорации «Артериум»

в Республике Казахстан

050060, г. Алматы, проспект Аль-Фараби д. 97,

3 подъезд, офис «54»

Тел/факс: 8(727)315-82-09; 8(727)315-82-10;

E-mail: office@arterium.kz

