







# Л-лизина эсцинат

## Показания к применению

- посттравматические, интра- и послеоперационные отеки любой локализации: отек головного и спинного мозга, в том числе с субарахноидальными и интравентрикулярными гематомами и смещением срединных структур головного мозга и синдромом отека-набухания
- отеки мягких тканей с вовлечением опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся локальными расстройствами их кровоснабжения и болевым синдромом
- тяжелые нарушения венозного кровообращения нижних конечностей при остром тромбозе

## Способ применения и дозы

Суточная доза препарата для взрослых составляет 5-10 мл.

5-10 мл препарата разводят в 15-50 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций и вводят только внутривенно (внутривенное введение не допускается). При состояниях, угрожающих жизни больного (острая черепно-мозговая травма, интра- и послеоперационная отечность головного и спинного мозга с явлениями отека-набухания, обширных отеков вследствие распространенных травм мягких тканей и опорно-двигательного аппарата), суточную дозу увеличивают до 10 мл дважды в сутки. Максимальная суточная доза для взрослых - 25 мл. Длительность применения препарата составляет 2-8 суток, в зависимости от эффективности терапии. У детей разовая доза вводится из расчета:

1-5 лет - 0,22 мг Л-Лизина эсцината на кг массы тела  
5-10 лет - 0,18 мг Л-Лизина эсцината на кг массы тела  
10 лет и старше - 0,15 мг Л-Лизина эсцината на кг массы тела.

Препарат вводят 2 раза в сутки. Продолжительность курса от 2 до 8 дней, в зависимости от состояния больного и эффективности терапии.

## Побочные действия

- аллергические реакции в виде кожной сыпи, крапивницы, ангионевротического отека

## Противопоказания

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата
- выраженные нарушения функции почек
- детский возраст до 1 года

## Лекарственные взаимодействия

При лечении Л-Лизина эсцинатом возможно назначение других лекарственных средств при соответствующих показаниях (противовоспалительных, анальгетиков, антимикробных). Препарат не следует применять одновременно с аминокислотами из-за возможности повышения их нефротоксичности. При необходимости одновременного назначения Л-Лизина эсцината и антикоагулянтов дозы последних необходимо снижать, (контроль протромбинового индекса). Связывание эсцина с белками плазмы ухудшается при одновременном применении антибиотиков цефалоспоринового ряда, что может повышать концентрацию свободного эсцина в крови с риском развития побочных эффектов последнего.

бодного эсцина в крови с риском развития побочных эффектов последнего.

## Особые указания

Не вводить препарат без разведения, как указано в разделе «Способ применения и дозы». **Беременность и период лактации.** Данные об опыте применения препарата беременным и в период лактации отсутствуют. **Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять автотранспортом или потенциально опасными механизмами.** Заболевания, при которых применяется препарат, исключают возможность вождения автомобильного транспорта.

## Условия отпуска из аптек

По рецепту

## Лекарственная форма

Раствор для инъекций 0,1% в ампулах №10

## ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ И ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

РК - ЛС - 5 №011430 от 23 апреля 2008 года

Разрешение №3405 от 31.05.2012 до 23.04.2013

Ближе к людям



# Ревмоксикам®

## Мелоксикам



Разрешение № 170 от 16.08.2008 г.  
РК-РС-5 № 010194 от 19.09.2007 г.  
РК-РС-5 № 010193 от 19.09.2007 г.  
РК-РС-5 № 011649 от 26.05.2008 г.

## Переход на новый уровень

**Лечение болевого синдрома и воспалительного процесса при артритах, артрозах, остеоартрозах, ревматоидном артрите!**

- ✓ Селективный ингибитор ЦОГ - 2.
- ✓ Анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.
- ✓ Удобное применение - 1 раз в день!
- ✓ Продолжительность действия - 24 часа!
- ✓ Выбор способа введения: в/м или внутрь
- ✓ Минимальный риск развития желудочно-кишечных осложнений.

## Ревмоксикам показан для лечения:

- воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов (артрозы, остеоартроз)
- ревматоидного артрита
- болезни Бехтерева.

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к мелоксикаму и другим НПВС (в том числе салицилатам), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, выраженные нарушения функции печени, почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью, детский возраст до 15 лет.

## Побочные действия

- диспепсия, тошнота, рвота, боли в животе, запор, кишечная колика, диарея, эзофагит, стоматит, редко - эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта
- головокружение, головная боль, шум в ушах, сонливость, лабильность настроения, раздражительность
- повышение артериального давления, ощущение сердцебиения, отеки, приливы
- изменение лабораторных показателей функции почек (повышение креатинина и/или мочевины в сыворотке крови)
- анемия, лейкопения, тромбоцитопения, снижение гематокрита и уровня гемоглобина в крови
- бронхоспазм, фотосенсибилизация, кожный зуд, сыпь (крапивница) на коже.

## Рекомендуемая схема постоперационной терапии

Показания	Путь введения	Доза/сутки	Продолжительность
Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов (артрозы, остеоартроз)	В/м, внутрь	15/7.5 мг 15 мг	3-5 дней 3-4 недели
Ревматоидный артрит	В/м, внутрь	15/7.5 мг 15 мг	3-5 дней 3-4 недели (до 2 мес.)
Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)	В/м	15 мг	3-5 дней



Перед назначением и применением внимательно прочитайте инструкцию! Условия отпуска из аптек. По рецепту. Производитель: ОАО «Фармак». 04080, Украина, г. Киев, ул. Фрунзе, 63. Представительство ОАО «Фармак» в РК: Алматы, ул. Топте би 291 а Л, оф 74, тел. +8(727) 250 10 29

