

# Эссенциале® форте Н

ВОССТАНАВЛИВАЕТ КЛЕТКИ ПЕЧЕНИ

## Показания к применению

Устранение отсутствия аппетита, ощущения тяжести в правом подреберье в результате токсического повреждения печени, несбалансированного питания, при острых и хронических гепатитах, включая алкогольную болезнь печени, лекарственные поражения печени, токсические гепатиты и стеатоз печени (жировая дистрофия печени).

## Способ применения и дозы

Эссенциале форте Н предназначен для применения у взрослых и детей старше 12 лет (с массой тела более 43 кг).

Разовая доза составляет 2 капсулы (600 мг эссенциальных фосфолипидов).

Суточная доза составляет по 2 капсулы 3 раза в день (1800 мг эссенциальных фосфолипидов).

Эссенциале форте Н нужно принимать,

не разжевывая, вместе с пищей, запивая обильным количеством воды (например, стаканом воды).

Продолжительность приема не ограничена.

## Побочные действия

Иногда

- боли в желудке, легкое послабление стула

Редко

- диарея

Очень редко

- аллергические реакции в виде сыпи и крапивницы

Частота неизвестна

- зуд

Прием Эссенциале форте Н должен быть прекращен в случае возникновения вы-

шеперечисленных побочных эффектов, особенно, в случае повышенной чувствительности. Пациент должен обратиться к врачу, который оценит серьезность симптома и примет адекватные меры для его устранения.

## Противопоказания

Больные с известной чувствительностью к фосфатидилхолину и/или к любому компоненту препарата

## Особые указания

Применение в педиатрии

Так как специальные исследования Эссенциале форте Н не проводились, данный препарат нельзя применять у детей младше 12 лет.

## Условия отпуска из аптек

Без рецепта



# Человек и Лекарство – Казахстан

Научно-практический тематический журнал


Юрий Шумков:  
Здоровый кишечник – залог здоровой и долгой жизни

В фокусе внимания гастроэнтерологов – полиморбидный больной!

Клинический протокол диагностики и лечения хронического гепатита С у взрослых

Международный опыт в отечественную практику

Печень как орган-мишень: чем мы можем помочь пациенту



№ 6 (37), 2014

Гастроэнтерология  
Гепатология



# УРСОСАН

Урсодезоксихолевая кислота

## ...бережная забота о Вашей печени

### Показания к применению

- синдром билиарного стазиса (застой), расширение желчевыводящих путей при функциональном нарушении печени и недостаточности удаления желчи хирургическим или эндоскопическим методом
- острый и хронический гепатит
- токсическое (алкогольное, лекарственное) поражение печени
- алкогольная болезнь печени
- холангиолитический синдром (от камней)
- первичный билиарный цирроз печени в стадии компенсации
- первичный склерозирующий холангит
- желтуха при муковисцидозе
- функциональный период, по поводу атрофии внутрисекреторных желчных путей
- дискинезия желчевыводящих путей
- билиарный рефлюкс-эзофагит, рефлюкс-эзофагит
- профилактика рецидивов камнеобразования после холецистэктомии
- профилактика подавления печени при применении гормональных контрацептивов и химиотерапии

### Способ применения и дозы

Урсосан принимают внутрь, не разжевывая и запивая достаточным количеством воды. При диффузных заболеваниях печени суточная доза Урсосана делится на 3-3 приема, капсулы принимают вместе с едой. При **остром и хроническом гепатитах** назначают в суточной дозе 10 мг/кг, которая делится на 3-3 раза в день вместе с едой в течение длительного времени (от нескольких месяцев до нескольких лет). При **холангиолитическом синдроме** (расширение желчевыводящих путей, желтуха и билиарный стазис), дискинезии желчевыводящих путей суточная доза составляет 10 мг/кг и принимается 3-3 раза в день. Курс лечения для расширения желчных протоков продолжается до полного расширения с последующим приемом в течение 3-х месяцев для профилактики рецидивов камнеобразования. При **дискинезии желчевыводящих путей** курс лечения устанавливается врачом. При **билиарном рефлюкс-эзофагите и рефлюкс-эзофагите** по 200 мг 3-3 раза в день, перед едой. Курс лечения – от 10-14 дней до 6 мес., при необходимости – до 2 лет. После холецистэктомии для профилактики повторного холелитиаза – 250 мг 2-3 раза в сутки в течение нескольких месяцев. Для профилактики поражения печени при применении гормональных контрацептивов и химиотерапии – 250 мг 2-3 раза в сутки в течение нескольких месяцев. При **токсическом, лекарственном поражении печени, алкогольном билиарном циррозе** – 10-15 мг/кг/сут в 3-3 приема. Длительность терапии составляет 6-12 месяцев и более. При **первичном билиарном циррозе** – 10-15 мг/кг/сут (при необходимости – до 30 мг/кг) в 3-3 приема. Длительность терапии составляет от 6 мес. до нескольких лет. При **первичном склерозирующем холангите** – 10-15 мг/кг/сут (до 30 мг/кг) в 3-3 приема. Длительность терапии составляет от 6 мес. до нескольких лет. При **муковисцидозе** детям старше 6 лет, с массой тела больше 24 кг, назначают в дозе 20-40 мг/кг/сут в 3-3 приема. Длительность терапии составляет от 6 мес. до нескольких лет. Детям с массой тела менее 24 кг (масса в 6-12 лет) рекомендуется суточная доза 10 мг/кг веса. В **послеоперационный период**, по поводу атрофии внутрисекреторных желчных путей – 10-15 мг/кг/сут в 3-3 приема. Длительность терапии составляет 6-12 месяцев и более.

### Побочные действия

Нервозность, вкрапления в кале, зуд, диарея, головная боль (может быть двусторонней), тошнота, рвота, диспепсия (транзиторная), повышение активности "печеночных" трансаминаз, дисперсионная реакция (желтушность), обострение ранее имевшегося псориаза, аллергия.

### Противопоказания

Гиперчувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата не имеет рентгенологического и/или биохимического подтверждения. Противопоказано при функциональном нарушении желчного пузыря, желчнокаменной болезни, острой желтухе, циррозе печени в стадии декомпенсации, панкреатической недостаточности, обструктивной желчнокаменной болезни, острой инфекционной обструктивной желчнокаменной болезни, протекании заболевания желчного пузыря. I триместр беременности и период лактации, детский возраст до 6 лет.

### Лекарственные взаимодействия

Антиаids, содержащие эритромицин и нитрофураны (фуразолидон), оральные контрацептивы, гипотензивные средства (зоксидин, нифедипин), препараты, снижающие активность урсодезоксихолевой кислоты (холестерин и могут снизить эффективность), растворы хлорсодержащих антисептиков, трифтороуксусной кислоты могут снижать абсорбцию урсодезоксихолевой кислоты.

### Особые указания

Применение урсодезоксихолевой кислоты во время II и III триместра беременности не имеет противопоказаний. Длительное применение урсодезоксихолевой кислоты для матерей и детей для защиты от вирусной инфекции.

### Особенности влияния препарата на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем или другими механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность управлять автомобилем или другими механизмами.

### Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Перед назначением и применением изучить инструкцию.

PRO.MED.CS  
Praha a.s.

Представительство "PRO.MED.CS Praha a.s." в РК, ТОО "PRO.MED.CS"  
г. Алматы, пр. Достык, 133, офис 9  
Тел.: 8-727-244-61-83

# Резалют® Про

## НОВЫЙ ГЕПАТОПРОТЕКТОР

## С ХОЛЕСТЕРИНСНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- Без красителей, стабилизаторов, ароматизаторов
- Обеспечивает не только защиту печени, но и снижает уровень холестерина

### Состав

Одна мягкая капсула содержит активное вещество - обезжиренные и обогащенные соевые фосфолипиды 300 мг: эссенциальные фосфолипиды.

### Показания к применению

- жировая дистрофия печени различной этиологии
- токсические поражения печени
- хронический гепатит
- легкая форма гиперхолестеринемии, в случае, если диета или прочие немедикаментозные меры (физическая активность и снижение веса) не дают достаточного эффекта

### Способ применения и дозы

Взрослые и подростки в возрасте 12 лет и старше принимают внутрь по 2 капсулы Резалюта® про 3 раза в сутки до еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. Длительность применения зависит от течения болезни.

Помогает печени  
утром, днем и вечером!



### Побочные действия

- ощущение дискомфорта в области живота
- диарея

### Противопоказания

- известная повышенная чувствительность к фосфолипидам, арахису, сое или другим компонентам лекарственного средства
- наличие антифосфолипидного синдрома
- беременность и период лактации
- детский возраст до 12 лет

### Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Представительство АО «Берлин-Хеми АГ» в РК  
Г.Алматы, ул.Луганского № 54, коттедж№2  
Тел. +7 (727) 244-61-83, 244-61-84, 244-61-85

Перед применением необходимо изучить инструкцию к медицинскому применению.

БЕРЛИН-ХЕМИ  
МЕНАРИНИ